

Подготовка кишечника для виртуальной колоноскопии

1. Подготовка без слабительных только для пациентов не страдающих запорами:

За 3 дня до диагностики пациент должен перейти на диету с низким содержанием клетчатки. В пищу не следует употреблять следующие продукты: фрукты, овощи, зелень, бобовые, грибы, ягоды, хлеб черный. Основная задача такой диеты - снизить газообразование в кишечнике. Свои предпочтения в еде в эти дни нужно отдавать следующим продуктам: бульон, отварное мясо, рыба, курица, сыр, масло, макароны, творог.

За день до исследования:

- Употреблять только жидкую пищу (бульон), в течении дня вместе с пищей принимать раствор тразографа (20 мл на 1 литр воды).
- В день исследования полное голодание, допускается чай, вода, ромашка за 2 часа до исследования.
- За 30 мин до исследования ношпа 2 таб 10 мг или в\м платифиллин 0.2% за 15 мин до исследования.

2. Подготовка с принятием слабительных фортранс или мовипреп.

За 3 дня до диагностики пациент должен перейти на диету с низким содержанием клетчатки. В пищу не следует употреблять следующие продукты: фрукты, овощи, зелень, бобовые, грибы, ягоды, хлеб черный. Основная задача такой диеты – снизить газообразование в кишечнике. Свои предпочтения в еде в эти дни нужно отдавать следующим продуктам: бульон, отварное мясо, рыба, курица, сыр, масло, макароны, творог.

Фортранс.

Накануне исследования легкий обед до 13.00. Исключить газообразующие продукты – сырые овощи, фрукты. Фортранс – развести из расчета: 1пакет на 20кг веса, каждый пакет растворить в 1л. Воды, принимать по стакану каждые 15 минут.

Половину раствора выпить с 14.00 до 17.00, в оставшийся добавить 1 ампулу тразографа (20мл) и выпить до 21.00. За 30 мин до исследования принять 2 табл. Но-шпа 10мг., и в\м платифиллин 0,2% за 15 мин до исследования.

Мовипреп.

	Схема приема препарата
Диета за 3 дня до проведения колоноскопии: согласно списку разрешенных продуктов. Диета накануне дня колоноскопии: - завтрак: согласно списку разрешенных продуктов; - обед и ужин: только разрешенные прозрачные жидкости.	День накануне колоноскопии: 19:00-20:00 принять первый литр раствора препарата, в который добавить 1 ампулу тразографа. 21:00-22:00 принять второй литр раствора препарата. После каждого принятого литра препарата необходимо выпить 500 мл разрешенной жидкости.